



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

ไอกรน

ในเด็ก

อาการคล้ายไข้หวัด
แต่อันตรายถึงตาย

- ไอ ต่อเนื่องตั้งแต่ 1 สัปดาห์
- มีน้ำมูก
- มีเสียงของลมหายใจดัง “วู้ป”
- อาเจียน ในขณะที่ไอหรือหลังอาการไอ
- มีอาการหน้าเขียวหรือหน้าแดงหลังอาการไอ



ป้องกันได้ด้วยการพาเด็กไปฉีดวัคซีนไอกรนตามแพทย์นัดหมายให้ครบถ้วน

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไอกรน ในเด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี จำนวน 5 ครั้ง

- ครั้งที่ 1 เริ่มเมื่ออายุ 2 เดือน
- ครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 4 เดือน
- ครั้งที่ 3 เมื่ออายุ 6 เดือน
- ครั้งที่ 4 เมื่ออายุ 18 เดือน
- ครั้งที่ 5 ฉีดวัคซีนกระตุ้นเมื่ออายุ 4 ปี

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567



กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข



สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12
The Office of Disease Prevention and Control 12



website



facebook

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Office of Disease Prevention and Control Region 12, Songkhla
odpc12.ddc.moph.go.th

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ



สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

ไอกรน

ในเด็ก

อาการคล้ายไข้หวัด
แต่อันตรายถึงตาย

การป้องกันเมื่อมีผู้ติดเชื้อไอกรน

การป้องกันโรคไอกรนสามารถใช้วิธีปฏิบัติ เช่นเดียวกับ
การป้องกันโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ

- ควรแยกผู้ป่วยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแก่ผู้อื่น
- สวมหน้ากากอนามัย
- ล้างมือบ่อย ๆ เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ
ผ่านน้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วย
- ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยและมีความเสี่ยง
อาการรุนแรง ควรไปพบแพทย์
เพื่อพิจารณาเรื่องยาป้องกัน
- ผู้สัมผัสผู้ป่วยไอกรน ควรสังเกต
ติดตามอาการภายใน 3 สัปดาห์หลังสัมผัสโรค
- หากมีอาการไอเรื้อรังติดต่อกัน
ควรหยุดเรียน หยุดทำงาน รับพบแพทย์



วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567



website



facebook

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Office of Disease Prevention and Control Region 12, Songkhla
odpc12.ddc.moph.go.th

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422